

**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO
Struttura Semplice “Attività di Produzione”**

OGGETTO:

**CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA CON UTILIZZO DEL LABORATORIO
MOBILE NEL COMUNE DI COLLEGNO, V. Boves, c/o Centro Civico Margherita Bonavero”**

RELAZIONE 3^a CAMPAGNA POST OPERAM (24 Luglio – 04 Settembre 2012)



Redazione	Funzione: Collaboratore Tecnico Professionale Nome: Fabio Pittarello	Data:	Firma:
Verifica e approvazione	Funzione: Dirigente con incarico professionale presso la S.S. di Produzione Nome: Dott. Francesco Lollobrigida	Data:	Firma:



Nucleo Operativo “Monitoraggio della Qualità dell’Aria” del Dipartimento di Torino di Arpa Piemonte: dott.ssa Annalisa Bruno, sig. Giacomo Castrogiovanni, dott.ssa Marilena Maringo, sig. Fabio Pittarello, sig. Francesco Romeo, ing. Milena Sacco, sig. Vitale Sciortino, sig. Roberto Sergi, coordinati dal Dirigente con incarico professionale dott. Francesco Lollobrigida.

Si ringrazia il personale degli Uffici Tecnici del Comune di Collegno per la collaborazione prestata.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FENOMENO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	5
<i>L'aria e i suoi inquinanti</i>	6
<i>Il Laboratorio Mobile</i>	8
<i>Il quadro normativo</i>	8
LA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO	13
<i>Obiettivi della campagna di monitoraggio</i>	14
<i>Elaborazione dei dati meteorologici</i>	17
Elaborazione dei dati relativi agli inquinanti atmosferici	25
Biossido di zolfo	26
Monossido di carbonio	27
Ossidi d'azoto	28
Benzene e toluene	32
Particolato sospeso (PM ₁₀)	34
Ozono	38
<i>Influenza della direzione del vento sui livelli degli inquinanti.....</i>	43
CONCLUSIONI	45
APPENDICE – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ANALIZZATORI	47

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FENOMENO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'ARIA E I SUOI INQUINANTI

Per inquinamento dell'aria si intende qualsiasi variazione nella sua composizione - determinata da fattori naturali e/o artificiali - dovuta all'immissione di sostanze la cui natura e concentrazione sono tali da costituire pericolo, o quantomeno pregiudizio, per la salute umana o per l'ambiente in generale.

Oggi giorno è analiticamente possibile identificare nell'atmosfera numerosissimi composti di varia origine, presenti in concentrazioni che variano dal nanogrammo per metro cubo (ng/m^3) al microgrammo per metro cubo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Le principali sorgenti di inquinanti sono:

- emissioni veicolari;
- emissioni industriali;
- combustione da impianti termoelettrici;
- combustione da riscaldamento domestico;
- smaltimento rifiuti (inceneritori e discariche).

Le emissioni indicate generano innumerevoli sostanze che si disperdono nell'atmosfera. Si possono dividere tali sostanze in due grandi gruppi: al primo appartengono gli inquinanti emessi direttamente da sorgenti specifiche (inquinanti primari), al secondo gruppo quelli che si producono a causa dell'interazione di due o più inquinanti primari per reazione con i normali costituenti dell'atmosfera, con o senza fotoattivazione (inquinanti secondari).

In

Tabella 1 sono indicate le fonti principali e secondarie dei più comuni inquinanti atmosferici.

La dispersione degli inquinanti nell'atmosfera è strettamente legata alla situazione meteorologica dei siti presi in esame; pertanto, per una completa caratterizzazione della qualità dell'aria in un determinato sito, occorre conoscere l'andamento dei principali parametri meteorologici (velocità e direzione del vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, irraggiamento solare).

Per una descrizione completa dei singoli inquinanti, dei danni causati e dei metodi di misura si rimanda alla pubblicazione "Uno sguardo all'aria - Relazione annuale 2010", elaborata congiuntamente dalla Provincia di Torino e da Arpa Piemonte, e disponibile presso ARPA Piemonte e Provincia di Torino.

Alla medesima pubblicazione si rimanda per una descrizione approfondita dei fenomeni meteorologici e del significato delle grandezze misurate.

Tabella 1 – Fonti principali e secondarie dei più comuni inquinanti atmosferici

<i>INQUINANTE</i>	<i>TRAFFICO AUTOVEICOLARE VEICOLI A BENZINA</i>	<i>TRAFFICO AUTOVEICOLARE VEICOLI DIESEL</i>	<i>EMISSIONI INDUSTRIALI</i>	<i>COMBUSTIONI FISSE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI LIQUIDI O SOLIDI</i>	<i>COMBUSTIONI FISSE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI GASSOSI</i>
<i>BIOSSIDO DI ZOLFO</i>					
<i>BIOSSIDO DI AZOTO</i>					
<i>BENZENE</i>					
<i>MONOSSIDO DI CARBONIO</i>					
<i>PARTICOLATO SOSPESO</i>					
<i>PIOMBO</i>					
<i>BENZO(a)PIRENE</i>					

 = fonti primarie
 = fonti secondarie

IL LABORATORIO MOBILE

Il controllo dell'inquinamento atmosferico nel territorio provinciale viene realizzato attraverso le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Le informazioni acquisite da tale rete sono integrate, laddove non siano presenti postazioni della rete fissa e si renda comunque necessaria una stima della qualità dell'aria, attraverso l'utilizzo di stazioni mobili gestite dalle sedi provinciali di Arpa Piemonte.

Il laboratorio mobile della Provincia di Torino è dotato di una stazione meteorologica e di analizzatori per la misura in continuo di inquinanti chimici quali biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene e di due campionatori di particolato atmosferico PM₁₀ e PM_{2,5} la cui concentrazione è determinata in laboratorio per via gravimetrica.

IL QUADRO NORMATIVO

La normativa italiana in materia di qualità dell'aria impone dei limiti per quegli inquinanti che risultano essere quantitativamente più rilevanti dal punto di vista sanitario e ambientale.

La normativa quadro è rappresentata dal D.Lgs. 351/99 ed attuata, per i valori limite di alcuni inquinanti, dal D.M. 60/2002, dal D.Lgs. 183/2004 e dal D.Lgs. 152/2007, come modificato dal D.Lgs. 120/2008. Detti limiti possono essere classificati in tre tipologie:

- **valore limite annuale** per gli inquinanti biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), materiale particolato PM₁₀, piombo (Pb) e benzene per la protezione della salute umana e degli ecosistemi, finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento su lungo periodo;
- **valori limite giornalieri o orari** per biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM₁₀, e monossido di carbonio (CO), volti al contenimento di episodi acuti d'inquinamento;
- **soglie di allarme** per il biossido di zolfo, il biossido di azoto e l'ozono, superate le quali può insorgere rischio per la salute umana, per cui le autorità competenti sono tenute ad adottare immediatamente misure atte a ridurre le concentrazioni degli inquinanti al di sotto della soglia d'allarme o comunque assumere tutti i provvedimenti del caso che devono comprendere sempre l'informazione ai cittadini.

Per quanto riguarda il parametro ozono con il D.Lgs. n. 183 del 21 maggio 2004, pubblicato sul supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2004 n. 171, la normativa italiana ha recepito la direttiva 2002/3/CE, per cui sono state abrogate le disposizioni concernenti l'ozono previste dal D.P.C.M. 28/3/83, D.M. 15/4/94, D.M. 25/11/94 e dal D.M. 16/5/96.

Nei limiti riferiti alla prevenzione a breve termine sono previste soglie di informazione e di allarme come medie orarie. A lungo termine sono previsti obiettivi per la protezione della salute umana e della vegetazione calcolati sulla base di più anni di monitoraggio.

Il recente **D.Lgs 155/2010** ha abrogato e sostituito le normative precedenti, senza però modificare i valori numerici dei limiti di riferimento degli inquinanti già normati; ha inoltre inserito nuovi indicatori relativi al PM_{2.5} e in particolare :

- un **valore limite, espresso come media annuale** , pari 25 µg/m³ da raggiungere entro il 1 gennaio 2015;
- un **valore obiettivo , espresso come media annuale** , pari 25 µg/m³ da raggiungere entro il 1 gennaio 2010.

La nuova normativa prevede inoltre per il PM2.5 un obiettivo nazionale di riduzione e un obbligo di concentrazione dell'esposizione il cui rispetto è calcolato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo in siti fissi di campionamento urbani, che verranno definite con Decreto del Ministero dell'Ambiente (art. 12 D.Lgs. 155/2011). Questi due ultimi indicatori esulano quindi dall'ambito della presente relazione.

Nella Tabella 2, nella Tabella 3 e nella Tabella 4 sono indicati i valori di riferimento previsti dalla normativa attualmente vigente.

Per una descrizione più ampia del quadro normativo si rimanda ancora alla pubblicazione "Uno sguardo all'aria - Relazione annuale 2011".

Tabella 2 – Valori limite per ozono e benzo(a)pirene

INQUINANTE	LIMITE	PARAMETRO	VALORE DI RIFERIMENTO	SUPERAMENTI CONCESSI	DATA PER IL RISPETTO DEL LIMITE
OZONO (O ₃) (D.Lgs. 21/05/04 n.183)	SOGLIA DI INFORMAZIONE	media oraria	180 µg/m ³	-	-
	SOGLIA DI ALLARME	media oraria	240 µg/m ³	-	-
	VALORE BERSAGLIO PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA	media su 8 ore massima giornaliera	120 µg/m ³ ⁽¹⁾	25 giorni per anno civile come media su 3 anni	2010
	VALORE BERSAGLIO PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE	AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	18000 µg/m ³ *h come media su 5 anni ⁽²⁾		2010
	OBIETTIVO A LUNGO TERMINE PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE	AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	6000 µg/m ³ *h ⁽²⁾		
BENZO(a)PIRENE (D.Lgs. 03/08/07, n. 152)	OBIETTIVO DI QUALITÀ	media mobile valori giornalieri (3)	1 ng/m ³ ⁽⁴⁾	-	-

(1) La media mobile trascinata è calcolata ogni ora sulla base degli 8 valori relativi agli intervalli h÷(h-8)

(2) Per AOT40 si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ e il valore di 80 µg/m³, rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8.00 e le 20.00.

(3) La frequenza di campionamento è pari a 1 prelievo ogni z giorni, ove z=3÷6; z può essere maggiore di 7 in ambienti rurali; in nessun caso z deve essere pari a 7.

(4) Il periodo di mediazione è l'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre)

Tabella 3 – Valori limite per alcuni inquinanti atmosferici

INQUINANTE	LIMITE	PERIODO DI MEDIAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	SUPERAMENTI CONCESSI	DATA PER IL RISPETTO DEL LIMITE
BIOSSIDO DI ZOLFO (SO ₂)	Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	350 µg/m ³	24 volte/anno civile	1-gen-2005
	Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana	24 ore	125 µg/m ³	3 volte/anno civile	1-gen-2005
	Valore limite per la protezione degli ecosistemi	anno civile	20 µg/m ³	--	19-lug-2001
		inverno (1 ott - 31 mar)			
Soglia di allarme	3 ore consecutive	500 µg/m ³	--	--	
BIOSSIDO DI AZOTO (NO ₂) e OSSIDI DI AZOTO (NO _x)	Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	200 µg/m ³ (NO ₂)	18 volte/anno civile	1-gen-2010
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 µg/m ³ (NO ₂)	--	1-gen-2010
	Soglia di allarme	3 ore consecutive	400 µg/m ³ (NO ₂)	--	--
	Valore limite annuale per la protezione della vegetazione	anno civile	30 µg/m ³ (NO _x)	--	19-lug-2001
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)	Valore limite per la protezione della salute umana	media massima giornaliera su 8 ore	10 mg/m ³	---	1-gen-2005
PIOMBO (Pb)	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	0.5 µg/m ³	---	1-gen-2005
PARTICELLE (PM ₁₀)	Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana	24 ore	50 µg/m ³	35 volte/anno civile	1-gen-2005
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 µg/m ³	---	1-gen-2005
BENZENE	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	5 µg/m ³	---	1-gen-2010

Tabella 4 – Valori obiettivo per arsenico, cadmio e nichel (D.Lgs. 03/08/07, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 26/06/08, n. 120)

INQUINANTE	VALORI OBIETTIVO ⁽¹⁾
Arsenico	6.0 ng/m ³
Cadmio	5.0 ng/m ³
Nichel	20.0 ng/m ³

(1) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM₁₀ del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

LA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

La campagna di monitoraggio condotta nel comune di Collegno, finalizzata al controllo della qualità dell'aria, è stata effettuata a seguito degli accordi tra Arpa Piemonte e i Comuni di Collegno e Venaria Reale formalizzati attraverso il "Tavolo tecnico di studio degli impatti e pressioni ambientali sul Quartiere Savonera".

Tali accordi prevedono l'analisi delle possibili ricadute sulla qualità dell'aria delle trasformazioni che interesseranno la porzione di territorio compresa tra il Comune di Venaria Reale e Collegno (Quartiere Salvo D'Acquisto e Borgata Savonera). In particolare è prevista la realizzazione della centrale termoelettrica di IREN "Torino Nord" in prossimità del territorio oggetto dell'indagine ambientale. Per valutare correttamente gli impatti si è deciso di effettuare una serie di campagne di misura prima dell'entrata in servizio della centrale termoelettrica, al fine di definire lo stato della qualità dell'aria ante operam, e, successivamente alla messa in funzione dell'impianto, l'effettuazione di ulteriori campagne nel medesimo sito per la definizione della qualità dell'aria post operam.

Le campagne di misura sono state calendarizzate in modo da acquisire informazioni ambientali in differenti condizioni meteorologiche; nello specifico sono state previste una prima campagna nel periodo invernale 2010-2011 e tre campagne distribuite nell'anno 2011 per lo studio delle condizioni ambientali ante operam (per le suddette quattro campagne sono già state redatte ed inviate le relative relazioni tecniche), ed ulteriori 4 campagne distribuite nel corso del 2012 per le valutazioni ambientali post operam (l'accensione della centrale IREN è stata effettuata a cavallo tra l'autunno e l'inverno del 2011). La presente relazione tecnica si riferisce alla terza campagna di monitoraggio post operam.

Il sito di posizionamento del mezzo mobile per l'esecuzione della campagna di monitoraggio è stato individuato nella frazione Savonera del Comune di Collegno, a seguito del sopralluogo effettuato congiuntamente tra i tecnici Arpa ed i tecnici del Comune di Collegno, e più precisamente presso:

Via Boves Collegno – c/o Centro Civico "Margherita Bonaverò"

Nelle figure 1, 2 e 3 è riportata l'ubicazione sulla mappa del sito in cui è stato posizionato il Laboratorio Mobile.

Il monitoraggio è stato condotto in estate, con il posizionamento del laboratorio mobile in data 24 luglio 2012 fino al successivo 04 settembre (43 giorni), quando il mezzo è stato spento e spostato. Si noti che per ragioni tecniche le elaborazioni sono state effettuate considerando esclusivamente i giorni di campionamento completi e pertanto non vi è corrispondenza con le date di posizionamento e spostamento del laboratorio mobile. Nello specifico i dati utili per l'effettuazione delle elaborazioni vanno dal 25 luglio al 03 settembre.

Va sottolineato che i dati acquisiti nel corso delle singole campagne condotte con i Laboratori Mobili non permettono di effettuare una trattazione in termini statistici, secondo quanto previsto dalla normativa per la qualità dell'aria, ma forniscono un quadro, seppure limitato dal punto di vista temporale, della situazione di inquinamento atmosferico relativa ai siti in esame.

Una trattazione completa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (allegato I del DLgs 155/2010), dovrebbe prevedere, infatti, campagne di monitoraggio caratterizzate da una durata tale da comprendere almeno il 14% annuo di misurazioni (una misurazione in un giorno, scelto a caso, di ogni settimana in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l'anno, oppure otto settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno).

I dati presentati forniscono quindi, in questa prima fase elaborativa, unicamente un quadro generale della situazione di inquinamento atmosferico del sito in esame; il confronto con i dati rilevati negli

stessi periodi della campagna dalle stazioni fisse della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria permette, inoltre, di effettuare considerazioni di tipo comparativo.

Al termine dell'effettuazione di tutte le campagne previste per il 2012, tenuto conto della disponibilità effettiva di dati validi, potranno essere effettuate valutazioni più generali della qualità dell'aria del sito esaminato e comparazioni tra le condizioni ambientali ante e post operam.

La stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria posizionata in Piazza Garibaldi a Venaria, è stata dismessa a fine 2008, come previsto dal piano di revisione del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria predisposto dalla Regione Piemonte d'intesa con le Amministrazioni provinciali, pertanto eventuali confronti e comparazioni di parametri chimici verranno effettuati utilizzando altre stazioni fisse delle rete torinese più vicine al sito di monitoraggio oggetto della presente relazione o comunque confrontabili perché con caratteristiche analoghe.

Figura 1 - Ubicazione del Laboratorio Mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Collegno (punto evidenziato in rosso) e della centrale termoelettrica (punto blu)




Figura 2 - Ubicazione del Laboratorio Mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Collegno – dettaglio del sito (punto evidenziato in rosso)




Figura 3 - Ubicazione del Laboratorio Mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Collegno – dettaglio del sito visto da satellite (punto evidenziato in rosso)



ELABORAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI

Nelle pagine successive vengono presentate le elaborazioni statistiche e grafiche relative ai dati meteorologici registrati durante il periodo di monitoraggio. In particolare per ognuno dei parametri determinati si riporta un diagramma che ne illustra l'andamento orario e una tabella riassuntiva che evidenzia i valori minimo, massimo e medio delle medie orarie, oltre alla percentuale dei dati validi.

I parametri meteorologici determinati sono elencati di seguito, unitamente alle rispettive abbreviazioni ed unità di misura:

P	pressione atmosferica	mbar
D.V.	direzione vento	gradi sessagesimali
V.V.	velocità vento	m/s
T	temperatura	°C
U.R.	umidità relativa	%
R.S.G.	radiazione solare globale	W/m ²

La campagna di monitoraggio è stata caratterizzata da condizioni meteo variabili con giornate di sole e temperature elevate, inframmezzate da rovesci piovosi distribuiti lungo tutta la campagna.

La Figura 4 mostra l'andamento della radiazione solare globale (R.S.G.) nel corso della campagna di monitoraggio. La durata e l'intensità dell'irraggiamento nelle giornate di tempo asciutto, risultano quelle tipiche per il periodo estivo, tenuto conto che il cielo è stato spesso coperto; infatti i valori massimi pur raggiungendo generalmente valori elevati rimangono comunque inferiori a 900 W/m² (per confronto nella seconda campagna di monitoraggio del 2012, effettuata tra aprile e maggio, i valori massimi nelle giornate di bel tempo superano abbondantemente i 900 W/m²). Nelle giornate nelle quali ha piovuto i valori massimi raggiunti sono stati generalmente compresi tra 400 - 600 W/m². Il valore di picco giornaliero più basso è stato misurato il 03 settembre, con un valore pari a 104 W/m².

La temperatura media di tutto il periodo di monitoraggio (Figura 5) è stata di 23,3°C, in linea con il valore del mese di agosto medio degli ultimi dieci anni. Il valore massimo pari a circa 35°C è stato registrato nelle tre giornate consecutive, 20-21-22 agosto. L'escursione termica giornaliera (tra giorno e notte) si assesta a valori compresi tra i 13 ed i 16°C, mentre nei giorni di pioggia si assiste evidentemente ad una sensibile contrazione dell'escursione; in particolare il 1 settembre l'escursione tra notte e giorno è pari a 6°C mentre il 3 settembre tale differenza si riduce a 3°C proprio a seguito delle piogge e del cielo costantemente coperto.

Per quanto riguarda l'umidità relativa (Figura 6) i valori massimi si sono raggiunti durante le giornate di pioggia, mentre si evidenzia la giornata del 26 agosto nella quale il valore minimo raggiunto è stato pari a 17%.

Durante la campagna il campo pressorio si è attestato generalmente tra i 980 ed i 990 mbar (Figura 7). I dati pluviometrici (Figura 8) indicano undici giornate di pioggia, di cui solo quattro caratterizzate da un livello significativo di precipitazioni, ovvero il 05 e 25 agosto ed il 1 e 3 settembre, dove sono stati registrati rispettivamente 10, 17, 18 e 12 millimetri di pioggia.

In generale la campagna è stata caratterizzata da una elevata dinamicità atmosferica e da condizioni meteorologiche differenti. I dati di velocità del vento registrati indicano una percentuale di calme (media oraria della V.V. inferiore a 0.5 m/s), pari a circa il 18%, distribuite soprattutto nelle ore notturne. In particolare la V.V. è risultata frequentemente superiore a 2 m/s, con numerose giornate nelle quali venivano superati i 3 m/s. In particolare il 3 settembre si registra il valore medio orario più elevato pari a 4,5 m/s (Figura 9).

Le elaborazioni relative alla direzione dei venti (Figura 10) indicano che buona parte degli episodi è compresa nel settore NNW-NE. Esaminando più nel dettaglio la situazione, è possibile evidenziare una rosa dei venti del periodo diurno con un numero significativo di accadimenti nel settore NNE-ENE, mentre nelle ore notturne il vento proviene soprattutto dal settore NNW-NNE. (Figura 11 e Figura 12).

Tabella 5 – Radiazione solare globale (W/m²)

Minima media giornaliera	22.6
Massima media giornaliera	317.3
Media delle medie giornaliere	224.3
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	224.3
Massima media oraria	884.0
Ore valide	984
Percentuale ore valide	100%

Tabella 6 – Temperatura (°C)

Minima media giornaliera	14.1
Massima media giornaliera	27.6
Media delle medie giornaliere	23.3
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	23.3
Massima media oraria	34.9
Ore valide	984
Percentuale ore valide	100%

Tabella 7 – Umidità relativa (%)

Minima media giornaliera	54.5
Massima media giornaliera	85.7
Media delle medie giornaliere	67.0
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	67.0
Massima media oraria	98.0
Ore valide	984
Percentuale ore valide	100%

Tabella 8 – Pressione atmosferica (mbar)

Minima media giornaliera	978.6
Massima media giornaliera	989.5
Media delle medie giornaliere	983.9
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	983.9
Massima media oraria	991.0
Ore valide	984
Percentuale ore valide	100%

Tabella 9 – Velocità vento (m/s)

Minima media giornaliera	0.65
Massima media giornaliera	1.44
Media delle medie giornaliere	0.94
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	0.94
Massima media oraria	4.50
Ore valide	973
Percentuale ore valide	99%

Figura 4 – Andamento della radiazione solare globale nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 5 – Andamento della temperatura nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 6 – Andamento dell'umidità relativa nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 7 – Andamento della pressione atmosferica nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 8 – Precipitazioni cumulate nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 9 – Andamento della velocità dei venti nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 10 – Rosa dei venti totale nel corso della campagna di monitoraggio




Figura 11 – Rosa dei venti diurna nel corso della campagna di monitoraggio





Figura 12 – Rosa dei venti notturna nel corso della campagna di monitoraggio



ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

Nelle pagine seguenti vengono riportate le elaborazioni statistiche dei dati e i superamenti dei limiti di legge relativi all'inquinamento dell'aria registrati dagli analizzatori nel periodo di campionamento. Si riportano di seguito le formule chimiche degli inquinanti, utilizzate come abbreviazioni:

C ₆ H ₆	BENZENE
NO ₂	BIOSSIDO DI AZOTO
SO ₂	BIOSSIDO DI ZOLFO
NO	MONOSSIDO DI AZOTO
CO	MONOSSIDO DI CARBONIO
O ₃	OZONO
PM ₁₀	PARTICOLATO SOSPESO PM ₁₀
C ₆ H ₅ CH ₃	TOLUENE

Copia di tutti i dati acquisiti è conservata su supporto informatico presso il Dipartimento di Torino (Attività Istituzionali di Produzione) e in rete sul sito "Aria Web" della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/servizi/ariaweb.htm>, a disposizione per elaborazioni successive e/o per eventuali richieste di trasmissione da parte degli Enti interessati.

Per ogni inquinante è stata effettuata una elaborazione grafica che permette di visualizzare, in un diagramma concentrazione-tempo, l'andamento registrato durante il periodo di monitoraggio. La scala adottata per l'asse delle ordinate permette di evidenziare, laddove esistenti, i superamenti dei limiti. Nel caso in cui i valori assunti dai parametri risultino nettamente inferiori ai limiti di legge, l'espansione dell'asse delle ordinate rende meno chiaro l'andamento orario delle concentrazioni. L'elaborazione oraria dettagliata è comunque disponibile presso lo scrivente servizio e può essere inviata su richiesta specifica.

Per una corretta valutazione dell'andamento degli inquinanti durante le diverse ore del giorno è possibile calcolare il giorno medio: questo si ottiene determinando, per ognuna delle 24 ore che costituiscono la giornata, la media aritmetica dei valori medi orari registrati nel periodo in esame. Ad esempio il valore dell'ora 2:00 è calcolato mediando i valori di concentrazione rilevati alle ore 2:00 di ciascun giorno del periodo di monitoraggio. In grafico vengono quindi rappresentati gli andamenti medi giornalieri delle concentrazioni per ognuno degli inquinanti.

In questo modo è possibile non solo evidenziare in quali ore generalmente si verifichi un incremento delle concentrazioni dei vari inquinanti, ma anche fornire informazioni sulla persistenza degli stessi durante la giornata.

Biossido di zolfo


Il biossido di zolfo è un gas incolore, di odore pungente. Le principali emissioni di SO₂ derivano dai processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (ad esempio gasolio, olio combustibile e carbone) nei quali lo zolfo è presente come impurità.

Una ridotta percentuale di biossido di zolfo nell'aria (6÷7%) proviene dal traffico veicolare, in particolare da veicoli a motore diesel. La concentrazione di biossido di zolfo presenta una variazione stagionale molto evidente, con i valori massimi durante la stagione invernale a causa del riscaldamento domestico. Fino a pochi anni fa, il biossido di zolfo era considerato uno degli inquinanti più problematici, per le elevate concentrazioni rilevate nell'aria e per i suoi effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente. Negli ultimi anni, con la limitazione del contenuto di zolfo nei combustibili imposta dalla normativa, si osserva la progressiva diminuzione di questo inquinante con concentrazioni che si posizionano ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.

Per quanto concerne la campagna di monitoraggio vi sono stati problemi di natura tecnico-strumentale che hanno compromesso la misura del biossido di zolfo, pertanto non vi sono dati validi disponibili. E' utile ricordare che, in generale, questo parametro non mostra alcuna criticità, poiché le azioni a livello nazionale per la riduzione della percentuale di zolfo nei combustibili e l'utilizzo del metano per gli impianti di riscaldamento hanno dato i risultati attesi e le concentrazioni di SO₂ sono sempre ampiamente al di sotto dei limiti normativi. Inoltre va aggiunto che, come già sopra descritto, il periodo più critico per tale inquinante è rappresentato dalla stagione invernale, mentre in estate si registrano i valori più bassi di concentrazione di SO₂.

Le campagne precedenti hanno mostrato una buona correlazione nell'andamento del SO₂ tra il sito di Collegno e la stazione fissa di Grugliasco in via Roma (definita come stazione urbana-residenziale di traffico), pertanto si riporta, in Figura 13, l'andamento orario di quest'ultima stazione, così da fornire una indicazione generale sui livelli di tale inquinante.

Figura 13 – SO₂: andamento della concentrazione oraria della stazione fissa di Grugliasco




Monossido di Carbonio

È un gas inodore ed incolore che viene generato durante la combustione di materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. L'unità di misura con la quale si esprimono le concentrazioni è il milligrammo al metro cubo (mg/m^3), infatti si tratta dell'inquinante gassoso più abbondante in atmosfera. Il traffico veicolare rappresenta la principale sorgente di CO, in particolare i gas di scarico dei veicoli a benzina. Quando il motore del veicolo funziona al minimo, o si trova in decelerazione si producono le maggiori concentrazioni di CO in emissione, per cui i valori più elevati si raggiungono in zone caratterizzate da intenso traffico rallentato.

Nell'ultimo ventennio, con l'introduzione delle marmitte catalitiche nei primi anni '90 e l'incremento degli autoveicoli a ciclo Diesel, si è osservata una costante e significativa diminuzione della concentrazione del monossido di carbonio nei gas di combustione prodotti dagli autoveicoli ed i valori registrati attualmente rispettano ampiamente i limiti normativi.

Per quanto concerne la campagna di monitoraggio vi sono stati problemi di natura tecnico-strumentale che hanno compromesso la misura del monossido di carbonio, pertanto non vi sono dati validi disponibili. E' utile ricordare che, nel sito di Collegno, questo parametro non ha mostrato criticità (vedere relazioni tecniche precedenti), anche a seguito delle politiche nazionali messe in atto negli ultimi anni come sopra riportato. Inoltre va aggiunto che il periodo più critico per tale inquinante è rappresentato dalla stagione invernale, mentre in estate si registrano i valori più bassi di concentrazione di CO. Le campagne precedenti hanno mostrato una buona correlazione nell'andamento del monossido di carbonio tra il sito di Collegno e le stazioni torinesi fisse di Rebaudengo e Rubino, pertanto si riporta, in Figura 14, l'andamento orario di queste ultime stazioni così da fornire una indicazione generale sui livelli di tale inquinante.

Figura 14 – CO: andamento della concentrazione oraria c/o le stazioni fisse di Torino-Rebaudengo e Torino-Rubino



Ossidi di Azoto

Gli ossidi di azoto vengono generati da tutti i processi di combustione, qualsiasi sia il tipo di combustibile usato.

Per il **monossido di azoto** la normativa non prevede valori limite, ma questo inquinante viene comunque misurato in quanto partecipa ai fenomeni di inquinamento fotochimico e si trasforma in biossido di azoto in presenza di ossigeno e ozono.


I livelli di NO nel corso della campagna di monitoraggio nel Comune di Collegno (Tabella 10) sono risultati sempre inferiori a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il valore massimo è stato raggiunto il 27 agosto con una media oraria pari a $48 \mu\text{g}/\text{m}^3$. In generale la campagna è stata caratterizzata da elevata dinamicità atmosferica, con eventi pluviometrici e presenza di vento con velocità spesso superiori ai 2 m/s (cfr. Figura 9), fattori questi ultimi che hanno influito considerevolmente sulla dispersione/trasporto degli inquinanti. La media dei valori orari risulta pari a $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e per confronto la media delle campagne di giugno 2011 risulta pari a $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

La Figura 15 evidenzia come sia l'andamento, sia i livelli di fondo di monossido di azoto presso il sito di monitoraggio nel comune di Collegno siano in generale confrontabili con quelli della stazione di monitoraggio fissa ubicata nel comune di Borgaro e classificata come fondo suburbano: solo in alcune ore si registrano valori più elevati a Collegno (picchi giornalieri) che sono da ascrivere a fenomeni di inquinamento locale (NO è un inquinante primario).

Tabella 10 – Dati relativi al monossido di azoto (NO) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Minima media giornaliera	5.2
Massima media giornaliera	10.8
Media delle medie giornaliere	7.0
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	7.0
Massima media oraria	48.1
Ore valide	980
Percentuale ore valide	100%

Figura 15 – NO: andamento della concentrazione oraria nel corso della campagna di monitoraggio e confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio



Il **biossido di azoto** è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi sia perché è per sua natura irritante, sia perché dà inizio, in presenza di forte irraggiamento solare, ad una serie di reazioni fotochimiche secondarie che portano alla formazione di sostanze inquinanti complessivamente indicate con il termine di “smog fotochimico”.

La formazione di NO₂ è piuttosto complessa, in quanto si tratta di un inquinante di origine mista, vale a dire in parte originato direttamente dai fenomeni di combustione e indirettamente dall’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto (NO) all’interno di un insieme complesso di reazioni fotochimiche.

Nel corso della campagna nel Comune di Collegno la concentrazione media oraria di NO₂ si è generalmente attestata al di sotto dei 40 µg/m³ (se si escludono alcune giornate dove i massimi orari misurati risultano lievemente superiori ma comunque al di sotto dei 70 µg/m³ - Figura 16), con una media oraria dell’intero periodo pari a 12 µg/m³. I fenomeni pluviometrici e la presenza di vento, che hanno caratterizzato l’intera campagna di monitoraggio, hanno sicuramente contribuito alla riduzione delle concentrazioni di NO₂: il valore minimo misurato, pari 1 µg/m³, è stato registrato in diverse giornate della campagna.

Durante la campagna non si è avuto alcun superamento del limite orario di 200 µg/m³ (che la normativa prevede che non venga superato più di 18 volte in un anno) e questo grazie all’elevata dinamicità atmosferica del periodo monitorato, che ha determinato condizioni favorevoli alla riduzione delle concentrazioni degli inquinanti.

Tabella 11 – Dati relativi al biossido di azoto (NO₂) (µg/m³)

Minima media giornaliera	5.8
Massima media giornaliera	26.5
Media delle medie giornaliere	12.3
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	12.2
Massima media oraria	65.4
Ore valide	979
Percentuale ore valide	99%
<u>Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200)</u>	0
<u>Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200)</u>	0
<u>Numero di superamenti livello allarme (400)</u>	0
<u>Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400)</u>	0

Il livello medio orario di NO₂ misurato a Collegno è confrontabile con il livello misurato nella stazione di Borgaro e generalmente inferiore a quello riscontrato nella stazione di Torino-Lingotto. Osservando il grafico di Figura 17, che riporta il giorno medio (calcolato sulla campagna in oggetto, come indicato a pag. 25), si nota che l’andamento del NO₂ nelle tre stazioni messe a confronto è caratterizzato da due campane, una che coinvolge alcune ore del mattino e l’altra che interessa le ore serali; i valori misurati a Collegno sono confrontabili con quelli di Borgaro e inferiori a TO-Lingotto.

La normativa in vigore prevede inoltre per il parametro ossidi di azoto totali, dato dalla somma del monossido e biossido ed espressi come biossido, un valore limite annuale per la protezione della

vegetazione. Tale limite non è stato preso in considerazione in quanto si riferisce a siti remoti, lontani dai centri abitati e industrializzati.

Figura 16 – NO₂ : confronto con i limiti di legge e con i dati di altre stazioni di monitoraggio





Figura 17 – NO₂ : andamento giorno medio - confronto con i dati di altre stazioni di monitoraggio



Benzene e Toluene

Il benzene presente in atmosfera viene prodotto dall'attività umana, in particolare dall'uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati.

La maggior fonte di esposizione per la popolazione deriva dai gas di scarico degli autoveicoli, in particolare dei veicoli alimentati a benzina; stime effettuate a livello di Unione Europea attribuiscono a questa categoria di veicoli più del 70% del totale delle emissioni di benzene.

Il benzene è presente nelle benzine come tale e si produce inoltre durante la combustione a partire soprattutto da altri idrocarburi aromatici. La normativa italiana in vigore fissa, a partire dal 1 luglio 1998, il tenore massimo di benzene nelle benzine all'uno per cento.

L'unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di benzene è il microgrammo al metro cubo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Il benzene è una sostanza classificata:

- dalla Comunità Europea come cancerogeno di categoria 1, R45;
- dalla I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) nel gruppo 1 (sostanze per le quali esiste un'accertata evidenza in relazione all'induzione di tumori nell'uomo) ;
- dalla A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) in classe A1 (cancerogeno accertato per l'uomo).

Studi di mutagenesi evidenziano inoltre che il benzene agisce sul bagaglio genetico delle cellule. Con esposizione a concentrazioni elevate, superiori a milioni di ppb, si osservano danni acuti al midollo osseo. Una esposizione cronica può provocare la leucemia (casi di questo genere sono stati riscontrati in lavoratori dell'industria manifatturiera, dell'industria della gomma e dell'industria petrolifera). Stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che, a fronte di un'esposizione a $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di benzene per l'intera vita, quattro persone ogni milione sono sottoposte al rischio di contrarre la leucemia.

La normativa vigente (DLgs 155 del 13/8/2010) prevede per il benzene un limite annuale pari $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da rispettare dal 2010 in avanti. Durante la campagna di monitoraggio nel Comune di Collegno è stata determinata una concentrazione media pari a $1,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Tabella 12) ed in generale i valori sono ricompresi tra 0,1 e $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. È importante sottolineare che l'inverno è il periodo più critico per tale inquinante, mentre si registrano valori decisamente più bassi nel periodo estivo, e che il limite imposto dalla normativa è calcolato su base annuale. Per confronto il valore medio rilevato presso la stazione di Torino Rubino, calcolato nel medesimo periodo della campagna a Collegno, è pari a $0,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre la media annuale della medesima stazione, per l'anno 2011, è pari a $2,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, al di sotto del limite normativo.

Per quanto riguarda il toluene la normativa italiana non prevede alcun limite, ma le linee guida del 2000 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano un valore di $260 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media settimanale.

Gli effetti del toluene sono stati studiati soprattutto in relazione all'esposizione lavorativa e sono stati dimostrati casi di disfunzioni del sistema nervoso centrale, ritardi nello sviluppo e anomalie congenite, oltre a sbilanci ormonali in donne e uomini.

Per il toluene la massima media giornaliera è risultata essere di $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e la massima media oraria di $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Tabella 15), entrambe ben al di sotto del valore guida consigliato dall'OMS.


Tabella 12 – Dati relativi al benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Minima media giornaliera	0.8
Massima media giornaliera	1.3
Media delle medie giornaliere	1.0
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	1.0
Massima media oraria	1.9
Ore valide	981
Percentuale ore valide	100%

Tabella 13 – Dati relativi al toluene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Minima media giornaliera	2.0
Massima media giornaliera	7.2
Media delle medie giornaliere	4.6
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	4.6
Massima media oraria	26.4
Ore valide	981
Percentuale ore valide	100%

Figura 18 – Benzene: andamento della concentrazione oraria nel corso della campagna di monitoraggio



Particolato Sospeso (PM10)

Il particolato sospeso è costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso in sospensione nell'aria. La natura delle particelle aerodisperse è molto varia: ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali, il materiale inorganico prodotto da agenti naturali, ecc... Nelle aree urbane il materiale può avere origine da lavorazioni industriali, dall'usura dell'asfalto, dei pneumatici, dei freni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare quelli con motore diesel.

Il rischio sanitario legato a questo tipo di inquinamento dipende, oltre che dalla concentrazione, anche dalle dimensioni delle particelle stesse; infatti le particelle con dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. Diversi studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra la concentrazioni di polveri nell'aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, a causa degli inquinanti che queste particelle veicolano e che possono essere rilasciati negli alveoli polmonari.

La legislazione italiana, recependo quella europea, non ha più posto limiti per il particolato sospeso totale (PTS), ma, prima con il D.M. 60/2002 e successivamente con il D.Lgs 155/2010, ha previsto dei limiti esclusivamente per il particolato PM₁₀, cioè la frazione con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm, più pericolosa in quanto può raggiungere facilmente trachea e bronchi ed inoltre gli inquinanti adsorbiti sulla polvere possono venire a contatto con gli alveoli polmonari.

Inoltre il D.Lgs 155/2010 ha introdotto un limite anche per il PM_{2,5} (diametro aerodinamico inferiore ai 2.5 µm) calcolati come media annuale pari a 25 µg/m³ da raggiungere entro il 1 gennaio 2015.

Durante la campagna sono state eseguite misure contemporanee di particolato fine PM₁₀ e di particolato PM_{2,5}: per il primo parametro sono disponibili 40 misurazioni su 41 giornate di monitoraggio (che corrispondono al 98% di dati validi), mentre per il secondo sono disponibili 41 medie giornaliere (che corrispondono al 100% di dati validi). Il limite giornaliero del PM₁₀ pari a 50 µg/m³ (da non superare più di 35 volte per anno civile) è stato superato 2 volte. Le medie del periodo dei valori di particolato PM_{2,5} e PM₁₀ sono rispettivamente pari a 19 µg/m³ e 12 µg/m³.

Osservando la Figura 19, dove vengono riportati gli andamenti dei due inquinanti, si nota una buona correlazione tra PM₁₀ e PM_{2,5} se si escludono i primi giorni della campagna dove si assiste alla presenza di condizioni di inquinamento locale che hanno favorito l'aumento della sola frazione PM₁₀. In Figura 20 si nota come gli andamenti del PM_{2,5} di Collegno e della stazione di Borgaro siano anch'essi confrontabili. Tale situazione indica che, in generale, buona parte della frazione che costituisce il particolato atmosferico è di origine secondaria, e, in quanto tale, può aver avuto origine anche da emissioni di precursori in zone lontane rispetto al punto di campionamento.

In Figura 21 vengono confrontati i valori di PM₁₀ registrati a Collegno con quelli misurati nelle altre stazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria: si nota, per il sito di Collegno, un andamento confrontabile con quello delle altre stazioni anche se con valori mediamente inferiori a tutte le stazioni di confronto. L'unica eccezione è riscontrabile nella prima parte del monitoraggio nella quale, presso il sito di Collegno, si registrano valori di concentrazione decisamente più elevati (con due superamenti del limite dei 50 µg/m³) rispetto alle altre stazioni di confronto: contestualmente però non si osserva un analogo innalzamento dei livelli di PM_{2,5} e quindi è verosimile ipotizzare che tale situazione sia ascrivibile ad un fenomeno di inquinamento locale che si è protratto per alcuni giorni ed ha evidentemente interessato la sola frazione di particolato denominata "coarse" ("grossolana") e compresa tra 2,5 e 10 µm (diametro aerodinamico), per la quale non è possibile individuare nel caso in esame delle cause specifiche ma che è in generale attribuibile a cause quali erosione del suolo, risospensione di polveri depositate, attività cantieristiche o di manutenzione stradale ecc..

Il periodo monitorato è stato caratterizzato da diversi eventi pluviometrici, alcuni dei quali intensi, e dalla presenza costante di vento con velocità superiori ai 2 m/s che hanno contribuito alla riduzione del particolato atmosferico; l'abbassamento dei valori medi di particolato si ha in corrispondenza dei giorni nei quali si sono verificate le precipitazioni più consistenti (5 e 25 agosto e 1 settembre).

Tabella 14 – Dati relativi al particolato sospeso PM₁₀ (µg/m³)

Minima media giornaliera	6
Massima media giornaliera	64
Media delle medie giornaliere	19
Giorni validi	40
Percentuale giorni validi	98%
<u>Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50)</u>	2

Figura 19 – Particolato sospeso PM₁₀ e PM_{2,5} : confronto con il limite giornaliero per la protezione della salute




Figura 20 – Particolato sospeso PM_{2,5}: confronto con la stazione fissa di Borgaro.




Figura 21 – Particolato sospeso PM₁₀: confronto con altre stazioni di monitoraggio




Tabella 15 – Media giornaliera del particolato sospeso PM₁₀ e PM_{2,5} (µg/m³)


DATA	Collegno Via Boves PM10	Collegno Via Boves PM2.5
25-lug	27	12
26-lug	32	18
27-lug	64	20
28-lug	52	16
29-lug	46	11
30-lug	32	14
31-lug	22	13
01-ago	13	13
02-ago	19	13
03-ago	19	14
04-ago	14	14
05-ago	15	12
06-ago	12	12
07-ago	11	10
08-ago	10	10
09-ago	14	12
10-ago	13	13
11-ago	14	7
12-ago	11	11
13-ago	16	16
14-ago	14	6
15-ago	17	16
16-ago	17	13
17-ago	14	14
18-ago	18	18
19-ago	17	17
20-ago	22	21
21-ago	17	13
22-ago	21	21
23-ago	17	11
24-ago	17	17
25-ago	17	14
26-ago	6	6
27-ago	6	6
28-ago	10	10
29-ago	20	9
30-ago	20	6
31-ago	9	9
01-set		5
02-set	8	5
03-set	15	8
media	19	12
massimo	64	21
minimo	6	5
n° di superamenti livello giornaliero protezione della salute PM10 (50 µg/m ³)	2	-

Ozono

L'ozono è un gas con elevato potere ossidante, di odore pungente. L'ozono presente nella troposfera, lo strato più basso dell'atmosfera, è un inquinante non direttamente emesso da fonti antropiche, che si genera in atmosfera grazie all'instaurarsi di un ciclo di reazioni fotochimiche (favorite da un intenso irraggiamento solare) che coinvolgono principalmente gli ossidi di azoto (NO_x) e i composti organici volatili (VOC).

I valori più alti di tale inquinante si raggiungono nella stagione calda quando la radiazione solare e la temperatura media dell'aria raggiungono i valori più alti dell'anno.

In forma semplificata, si possono riassumere nel modo seguente le reazioni coinvolte nella formazione di questo inquinante:



L'elevato potere ossidante dell'ozono è in grado di produrre infiammazioni e danni all'apparato respiratorio più o meno gravi, in funzione della concentrazione cui si è esposti, della durata dell'esposizione e della ventilazione polmonare, in particolar modo nei soggetti sensibili (asmatici, bambini, anziani, soggetti aventi patologie respiratorie).

La campagna di misura è stata caratterizzata da condizioni meteo molto eterogenee sia da un punto di vista anemo-pluviometrico che per quanto concerne le temperature (i cui massimi giornalieri oscillano tra 20 e 35 °C) e questo ha influito direttamente sulla formazione/trasporto/accumulo dell'ozono. I livelli sono generalmente risultati inferiori a 160 µg/m³ (Figura 22), tranne che in tre giornate (26 e 27 luglio e 9 agosto) nelle quali i valori hanno raggiunto soglie decisamente più elevate con un massimo orario pari a 187 µg/m³; contestualmente si osservano numerosi dati orari che superano la soglia dei 120 µg/m³ che contribuiscono al superamento del limite per la protezione della salute. Riassumendo si sono registrati 15 superamenti del livello di protezione della salute (120 µg/m³ calcolata come massima media trascinata sulle 8 ore), ed 1 superamento del livello d'informazione (pari a 180 µg/m³ come media oraria); non è stato invece mai superato il livello di allarme (pari a 240 µg/m³ per almeno tre ore consecutive). La media dell'intero periodo è pari a 67 µg/m³.

Rispetto alla campagna precedente (aprile – maggio 2012), il valore medio dell'intero periodo è aumentato di poco, passando da 65 a 67 µg/m³, e questo nonostante le concentrazioni massime giornaliere di questa ultima campagna (agosto) siano generalmente più elevate, ed inoltre anche le temperature medie della campagna di agosto sono decisamente più alte rispetto a quelle della campagna di aprile (23°C rispetto a 14°C). Tale anno malia è da ascrivere ai differenti andamenti giornalieri nei due periodi in esame: ad agosto l'andamento medio giornaliero delle concentrazioni di O₃ è quello tipico estivo con valori bassi nelle ore notturne ed il picco massimo nel primo pomeriggio (forte gradiente di concentrazione), mentre ad aprile si osservano numerose giornate nelle quali i valori rimangono elevati lungo le ventiquattro ore (senza l'abbassamento notturno) e contenuti entro un intervallo di concentrazioni limitato. I risultati di queste condizioni vengono evidenziati nel grafico riportato in Figura 24, che riporta il giorno medio delle due campagne (aprile ed agosto 2012), calcolato come indicato a pag. 25: si nota che nel periodo primaverile i valori minimi sono maggiori di quelli della campagna estiva, mentre per i valori massimi avviene l'opposto, e conseguentemente le due medie del periodo sono confrontabili tra loro nonostante gli andamenti mostrino condizioni ambientali decisamente differenti.

In Figura 22 viene riportato l'andamento orario della concentrazione di ozono, confrontata con la stazione fissa di Borgaro, dal quale risulta che i due siti sono in generale comparabili per quanto concerne l'andamento.

L'elevato numero di giorni nei quali si ha il superamento del limite per la protezione della salute ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ calcolata come massima media trascinata sulle 8 ore), è strettamente legato alle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la campagna di misura. Se da un lato le alte temperature e la forte radiazione solare hanno contribuito alla formazione dell'inquinante, dall'altro va osservato che la presenza di giornate con forte vento e/o caratterizzate da eventi pluviometrici significativi, ha inciso fortemente sulla riduzione dei livelli di ozono in atmosfera (che in assenza di questi fattori avrebbero potuto essere più elevati e determinare così un numero maggiore di superamenti del limite).

Un fenomeno interessante è rappresentato dalla relazione ozono-temperatura nel periodo 20-22 agosto: in tale intervallo infatti le temperature medie orarie raggiungono i valori più alti della campagna (cfr. Figura 5) mentre non si registrano contestuali valori elevati di ozono (il maggior numero di superamenti è stato rilevato nella prima metà del monitoraggio). Questa situazione mostra in definitiva come il livello delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, soprattutto quelli di formazione secondaria, sia il risultato di complessi meccanismi di formazione/trasporto/accumulo che non sono sempre immediatamente e chiaramente individuabili, e di conseguenza descrivibili con semplici approcci statistico-matematici.

Tabella 16 – Dati relativi all'ozono (O_3) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Minima media giornaliera	32.6
Massima media giornaliera	97.1
Media delle medie giornaliere	67.0
Giorni validi	41
Percentuale giorni validi	100%
Media dei valori orari	67.0
Massima media oraria	186.5
Ore valide	982
Percentuale ore valide	100%
Minimo medie 8 ore	9.0
Media delle medie 8 ore	67.0
Massimo medie 8 ore	159.9
Percentuale medie 8 ore valide	100%
<u>Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore (120)</u>	78
<u>Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h > 120)</u>	15
<u>Numero di superamenti livello informazione (180)</u>	2
<u>Numero di giorni con almeno un superamento livello informazione (180)</u>	1
<u>Numero di valori orari superiori al livello allarme (240)</u>	0
<u>Numero di superamenti livello allarme (240 per almeno 3 ore consecutive)</u>	0
<u>Numero di giorni con almeno un valore superiore al livello allarme (240)</u>	0

Figura 22 – O₃: andamento della concentrazione oraria e confronto con i limiti di legge




Figura 23 – O₃: confronto con i limiti di legge (media trascinata sulle 8 ore)





Figura 24 – O₃: andamento giorno medio – confronto tra le due campagne post operam



INFLUENZA DELLA DIREZIONE DEL VENTO SUI LIVELLI DEGLI INQUINANTI

In prossimità del sito di monitoraggio di via Boves è posto un asse viario ad elevato traffico veicolare rappresentato dalla Tangenziale di Torino; il punto di minima distanza è posto a circa 500 m nel settore SE-SSE. La zona dove si trova la centrale termoelettrica dista dal sito di monitoraggio poco più di 1 km (Figura 1). Allo scopo di determinarne l'influenza delle fonti di inquinamento sulla qualità dell'aria del sito in esame, i dati di concentrazione sono stati elaborati in modo da ottenere i livelli medi degli inquinanti in funzione della direzione di provenienza del vento; generalmente gli inquinanti che vengono utilizzati per tale elaborazione sono il monossido di azoto e biossido di zolfo, due inquinanti primari, per i quali è con buona approssimazione ipotizzabile l'assenza di trasformazioni significative nell'intervallo temporale tra il momento dell'emissione e quello in cui vengono misurati in aria ambiente. Per effettuare l'elaborazione vengono utilizzati esclusivamente i valori orari di NO e SO₂ per i quali la velocità media oraria del vento era superiore o uguale a 0,5 m/s.

Per la campagna di monitoraggio, oggetto della presente relazione, non è possibile effettuare valutazioni inerenti il biossido di zolfo in quanto non vi sono dati validi disponibili, pertanto verranno presentate esclusivamente le elaborazioni del monossido di azoto.

Per il monossido di azoto non si osservano direzioni prevalenti lungo le quali è maggiore l'afflusso di tale inquinante (Figura 25), e tale situazione trae la sua origine dalle condizioni meteo climatiche che hanno caratterizzato la campagna (regime dei venti e pluviometrico eterogeneo); inoltre i valori medi calcolati lungo le varie direzioni sono relativamente bassi (valore massimo è 7,7 lungo il semiasse S) come del resto ci si attende nel periodo estivo. In generale è opportuno notare che per alcune direzioni di provenienza del vento la frequenza degli accadimenti è molto bassa e quindi i corrispondenti livelli di inquinante possono avere una rappresentatività poco significativa (cfr. Figura 10).

La possibile influenza dell'elevato traffico veicolare che caratterizza la Tangenziale di Torino sulla qualità dell'aria del sito in esame è stata ricercata confrontando l'andamento del giorno medio del monossido di azoto, nel caso in cui il sito risulti sottovento rispetto alla tangenziale (venti tra E e SW) e quando risulta sopravvento alla stessa (venti tra WSW e ENE); tale elaborazione è mostrata in Figura 26. Si nota, alle ore 10, un livello di concentrazione superiore nella condizione di sottovento con un valore pari a 13 µg/m³ (valore quest'ultimo che rimane comunque estremamente contenuto in termini di concentrazione). Si osservano inoltre, sempre per il diagramma relativo alla condizione di sottovento, un'ora mancante (ore 3): in tale ora la velocità del vento è risultata sempre inferiore a 0,5 m/s, pertanto i relativi valori di concentrazione di NO sono stati esclusi dal calcolo della media. Interessanti risultano anche le due curve nell'intorno delle ore 7, le quali pur presentando un incremento di concentrazione rispetto al valore di fondo, rimangono sostanzialmente sovrapponibili.

In generale per queste elaborazioni è opportuna una nota di cautela: vista la breve durata del monitoraggio, per alcune ore del giorno la frequenza degli accadimenti può essere molto sbilanciata verso una delle due situazioni, sottovento o sopravvento, quindi i corrispondenti livelli di inquinante possono avere una rappresentatività poco significativa. Ad esempio rispetto al totale delle ore disponibili per l'elaborazione dei dati di NO, solo il 13% di queste ultime rappresenta il sito di Collegno in condizioni di sottovento, mentre il restante 87% è riferito alle condizioni di sopravvento. Va inoltre considerato che, di norma, il regime dei venti, per quanto riguarda sia l'intensità che la direzione di provenienza, può presentare variazioni significative in termini di stagionalità.

Si sottolinea che non è possibile, con i soli dati del monitoraggio, attribuire un peso percentuale ai contributi delle singole sorgenti presenti nell'area di studio; pertanto a tale proposito si rimanda all'analisi modellistica che è in corso all'interno del progetto, la quale prenderà in considerazione anche il contributo della centrale Torino Nord, e che sarà oggetto di specifica relazione tecnica.

Figura 25 – Concentrazioni di NO in funzione della direzione di provenienza del vento nel corso della campagna di monitoraggio nel Comune di Collegno





Figura 26 – Andamento del giorno medio di NO per condizioni del sito di monitoraggio sopravento e sottovento alla Tangenziale



CONCLUSIONI

Lo stato della qualità dell'aria emerso per il comune di Collegno a seguito della campagna di monitoraggio condotta con l'utilizzo del Laboratorio Mobile rispecchia quanto osservato in siti simili della provincia di Torino.

Le soglie di allarme non sono mai state superate entrambi gli inquinanti (biossido di azoto e ozono), per i quali la normativa prevede tale tipo di limite; sono inoltre stati rispettati i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto ed il benzene, ovvero tutti gli inquinanti per i quali sono previsti dalla normativa specifici valori di riferimento, ad eccezione dell'ozono e del particolato atmosferico PM₁₀. Infatti per l'ozono sono stati registrati 15 superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (120 µg/m³ calcolata come massima media trascinata sulle otto), ed 1 superamento del livello di informazione (numero di giorni con almeno una media oraria superiore a 180 µg/m³), mentre per il PM₁₀ sono stati rilevati 2 superamenti del limite per la protezione della salute (50 µg/m³ media giornaliera). L'analisi dei dati evidenzia che i due superamenti in questione sono imputabili alla sola frazione di particolato denominata "coarse" ("grossolana") e compresa tra 2,5 e 10 µm (diametro aerodinamico), la quale è in generale attribuibile a cause quali erosione del suolo, risospensione di polveri depositate, attività cantieristiche o di manutenzione stradale, ecc..

Con l'eccezione dei casi citati, i dati disponibili evidenziano che la frazione che compone il PM₁₀ è costituita per una percentuale significativa di tipo secondario.

Nel loro insieme i dati presentati mostrano una situazione con criticità relativamente ridotte, con l'eccezione dell'ozono e del particolato. Tale situazione trae la sua origine dalla dinamicità atmosferica relativamente elevata registrata nel periodo di monitoraggio con presenza di vento e precipitazioni; si conferma pertanto la notevole influenza dei meccanismi di diluizione e rimozione ad opera dei fenomeni meteorologici nel determinare i livelli degli inquinanti atmosferici. Per quanto concerne l'ozono va sottolineato che si tratta di un fenomeno di inquinamento atmosferico che nei mesi estivi interessa tutto il territorio provinciale e regionale e quindi non caratteristico del sito in esame; trattandosi di un inquinante secondario, non emesso direttamente da fonti antropiche e che può avere origine anche in zone lontane rispetto al sito di misura, la sua gestione, e la conseguente riduzione, deve essere attuata attraverso politiche ad ampia scala territoriale.

APPENDICE - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ANALIZZATORI

- **Biossido di zolfo** **API 100 E**

Analizzatore a fluorescenza classificato da EPA (U.S. Environmental Protection Agency) per la misura della concentrazione di SO₂ nell'aria ambiente.

 - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 2000 ppb;
 - ✓ Limite inferiore di rivelabilità < 1 ppb.

- **Ossidi di azoto** **MONITOR EUROPE ML 9841B**

Analizzatore reazione di chemiluminescenza classificato da EPA quale metodo di riferimento per la misura della concentrazione di NO/NO_x.

 - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 20000 ppb;
 - ✓ Limite inferiore di rivelabilità : 0.5 ppb.

- **Ozono** **MONITOR EUROPE ML 9810B**

Analizzatore ad assorbimento ultravioletto classificato da EPA per la misura delle concentrazioni di O₃ nell'aria ambiente.

 - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 20 ppm;
 - ✓ Limite inferiore di rivelabilità: 0.001 ppm.

- **Monossido di carbonio** **API 300 A**

Analizzatore a filtro a correzione di gas classificato da EPA quale metodo di riferimento per la misura della concentrazione di CO nell'aria ambiente.

 - ✓ Campo di misura: 0 ÷ 200 ppm;
 - ✓ Limite inferiore di rivelabilità: 0.1 ppm.

- **Particolato sospeso PM10** **TECORA CHARLIE AIR GUARD PM**

Campionatore di particolato sospeso PM10; campionamento delle particelle sospese con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm in aria ambiente, con testa di prelievo EPA.
Analisi gravimetrica su filtri in fibra di quarzo MILLIPORE di diametro 47 mm.

- **Stazione meteorologica** **LSI LASTEM**

Stazione completa per la misura dei seguenti parametri: velocità e direzione vento, temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, irraggiamento solare.

- **Benzene, Toluene, Xileni** **SINTECH SPECTRAS CG 855 serie 600**

Gasromatografo con doppia colonna, rivelatore PID (fotoionizzazione)

 - ✓ Campo di misura benzene: 0 ÷ 324 µg/m³
 - ✓ Campo di misura toluene: 0 ÷ 766 µg/m³
 - ✓ Campo di misura xileni : 0 ÷ 442 µg/m³

